


■■■ 感染管理に係るリンクナース育成研修会・Q & A ■■■

◇ 令和5年7月29日（土）「基本的な感染管理のおさらい」

午前の部/10:00～11:45（45名） 午後の部/13:30～15:15（52名）

◇ 講師：岩手県立二戸病院 感染管理認定看護師 鈴木 直子 氏
岩手県立釜石病院 感染管理認定看護師 紺野 由香里 氏



◇ 受講者からの質問

質問	回答
1 感染者が増えた時、血圧計等が不足し使い回しているが不安である。	感染症患者に使用する血圧計等（特に接触感染対策）は、個人専用にした方が感染リスクは少なくなります。 感染者が増えた場合は、大部屋隔離患者用としてワゴン等に1台配置して使用することは可能です。患者毎に手袋を交換し、血圧計は使用毎にアルコール清拭しワゴンに置く方法で良いです。
2 入浴介助時、血圧計を使い回しているがマンシェット等はアルコール消毒でよいか。	可能であれば、清拭出来るタイプのマンシェットがよいと思います。布製の場合、汚染時は洗濯が必要ですが、通常は界面活性剤入りの環境・器械洗浄用クロスまたはアルコール消毒での拭き取りでよいです。
3 血圧計等、医療機械はアルコール消毒をすると白くなるが、適切な消毒方法について知りたい。	アルコール消毒可能な医療機器と使用できない機器があり、業者等に確認が必要です。アルコールが使用できない場合は、環境・機器洗浄用クロス等で物理的に除去、または機器に適した消毒クロス（透析器械などはルビスタ®）を使用しています。
4 PPEの着脱順序ポスターを掲示して周知したいが、ネット上で良いサイトはないか。	ネット上にたくさん出ていると思いますが、今回の研修資料のパワーポイントを掲示することも可能です。自施設の着脱順に合わせ変更して使用して下さい。 シオノギ製薬医療関連感染対策研修サポートツールも資料作成時に使用しています。
5 フェイスシールドを再使用したいが、消毒方法や置き場所について教えてほしい。	ゴーグルを脱衣後、アルコールで湿式清掃しビニール袋等に入れ、PPE着衣エリアに置いて下さい。。可能であれば、未使用の手袋等を準備しているエリアとは別に置くことを推奨します。（下段に置く等）
6 新型コロナウイルス感染症において、N95マスクは必ず必要か。	必須ではありません。 喀痰吸引などのエアロゾルが発生する処置時ののみの着用でよいです。
7 手袋をして処置後、アルコール消毒すれば、次の処置をしてもよいか。	手袋の上から手指消毒を行うと手袋に穴が空きやすいため、基本的には推奨しません。しかし、コロナの場合はインナー手袋を素手と見なし、2重手袋で対応することがあります。